

説明

Follis FR 製品シリーズには、さまざまな濃度のミノキシジル (数値は % w/v を示します) を含む局所的な脱毛治療薬が含まれています。各 FR 製品には、ミノキシジル (USP または硫酸塩) と、メントール、アデノシン、プロシアニジン B-2、Procapil ブレンド、Folicusan ブレンド、フィナステリド、アルファトラジオール、GHK-Cu 溶液、銅トリペプチド-1 などのさまざまな補完的有効成分を組み合わせた独自の処方があります。

FR 治療は、男性型および女性型脱毛症と戦う強力な武器です。Follis FR シリーズは、他のヘア トリートメントに比べていくつかの独自の利点があります。FR 治療は、他の一般的なソリューションよりも速く、より効果的に作用し、忍容性と副作用は同様です。これにより、ユーザーは通常の太くて健康な髪を維持でき、以前はミノキシジルだけでは効果がなかったユーザーにも効果がある可能性があります。これらの治療は、頭皮の頂点 (頭頂部) と前頭部の生え際の両方を対象としています。

FR 02 は男性にも女性にも安全です。FR 05、07、10、12、15、16 は男性専用です。

臨床薬理学

ミノキシジル溶液を局所的に塗布すると、アンドロゲン性脱毛症 (男性型および女性型脱毛症) の患者の発毛を促進することが、数多くの臨床研究で示されています。作用の正確なメカニズムは複数ある可能性があります。その方法には、1) 毛包細胞を刺激して毛周期の増殖期 (成長期) に導く、2) 休止期の毛包 (休止期) を刺激して成長期に導く、3) アンドロゲン代謝を阻害して毛包に影響を及ぼす能力を阻害する、などがあります。

これらの製剤に使用されている他の化合物は、細胞内のイオンチャンネルを開き、ジヒドロテストステロン (DHT) を抑制し、毛包周囲の線維化を防ぎ、抗酸化作用をもたらし、毛包の成長期を延長し、血管内皮増殖因子の発現を増加させ、タンパク質キナーゼ C (PKC) アイソザイムを選択的に抑制し、慢性炎症をブロックすることがさまざまな研究で示されています。

禁忌

この処方、その成分のいずれかに対して過敏症反応の履歴のある人には禁忌です。過敏症が認められた場合は、使用を中止してください。

一般的な

- 脱毛症に対する他の局所的治療と同様に、早期に開始することが重要です。この技術は休止状態にある毛包を活性化させるため、何年も経つと活発に反応しなくなる可能性があります。• FR 治療は、以下の原因で起こる脱毛を予防または回復させるものではありません。薬物、甲状腺機能低下症、化学療法、または原因となる疾患頭皮の瘢痕
- 最良の結果を得るには、毎日2回、塗布を怠らずに頭皮に直接塗布してください。

• FR トリートメントは、一部のユーザーでは頭皮の炎症を引き起こす可能性があります。炎症が続く場合や悪化する場合は、使用を中止し、医師に相談してください。

• 髪の毛は通常1ヶ月に1~1.5cm伸びるため、男性の多くは2ヶ月以上かかりますが、最短1ヶ月で再成長が見られる場合もあります。

• FR 治療を開始すると、新しい毛髪の準備のために古い毛髪が抜け落ちる現象が最大2週間続くことがあります。それ以上続く場合は、製品の使用を中止し、医師に相談してください。• 脱毛症が主に遺伝によるものである場合は、FR の使用を継続してください。

トリートメントは必要ではありません。他の要因による場合は、トリートメントを中止してヘアケアを続けることも可能です。

• 顔の毛が生えてこないように、FR トリートメントは寝る前に乾がしてください。にじまないようにし

てください。• 1日2回、アプリークーターで1ml (5プッシュ) を直接肌に塗布します。

薄毛や脱毛の部分に塗布してください。使用量が少ないと効果が低下します。[FR 16の場合、1日2回3プッシュのみ使用して

ください] • 塗り忘れた場合は、追加で塗って補おうとしないでください。通常のスケジュールに戻して

ください。• FR 治療は 18 歳未満の方は使用しないでください。

警告

心拍数が上がったり、めまいや息切れを感じた場合は、FR トリートメントの使用を中止し、直ちに医師の診察を受けて

ください。妊娠中または授乳中の女性には医師の診察を受ける使用しないでください。突然、説明のつかない体重増加、手足のむくみ、または顔の不要な毛の成長が起こった場合は、使用を

中止して医師に相談してください。最も一般的な副作用は、赤みと炎症です。低血圧の場合、または血圧降下剤を服用している場合は、FR

トリートメントを使用しないでください。心不全または重大な冠動脈疾患のある人は、これらの副作用のため FR トリートメントを避ける必要があります。体の他の部分での不要な毛の成長を防ぐには、頭皮への FR トリートメントの適用を制限し、石鹸で手を洗ってください。使用後は水で洗い流し、就寝前にローションが完全に乾くまで待ちます。

使用方法

使用前によく振ってください。1日2回、5プッシュを患部に直接塗布してください。

薄毛や抜け毛に効果があります。[FR 16 の場合は 3 プッシュ使用] FR トリートメントは、髪を洗ったかどうかに関係なく適用できます。スプレー容器を頭皮に近づけて、溶液が髪に付かないようにしてください。ローションを頭皮にマッサージしてください。洗い流さなくてください。使用後はすぐに石鹸と水で手を洗ってください。

製品の外観は、時間の経過とともにわずかに暗くなる場合があります。変化は正常であり、効能や期待される結果に変化がないことを示しています。

過剰摂取

薬を過剰に使用した場合、発毛はそれほど速くはならないが、副作用の可能性は高まる。

質問と回答

Q: FR トリートメントは安全ですか? A: FR トリートメントには、

安全性、特に局所使用においては、ミノキシジル、フィナステリド、アデノシンの有効成分は数多くの臨床試験でテストされ、安全であることが証明されています。局所用ミノキシジルは長年市場に出回っており、副作用の発生率は非常に低く、何百万人もの人々に使用されています。低血圧または高血圧を患っている場合や心臓疾患がある場合は、FR治療を使用しないでください。

Q: ヘアスプレー、ムース、ジェルなどは使えますか？

A: ヘアスプレー、ジェル、その他のスタイリング剤は毛包を詰まらせる傾向があるため、お勧めできません。スタイリング剤を使用する場合は、まずFRトリートメントを塗布し、完全に乾くまで待ってからスタイリングしてください。

Q: FRトリートメントを使用しながら髪を染めたりパーマをかけたりできますか？

A: カラーリング、パーマ、ヘアリラクサーの使用が脱毛に影響を与えるという明確な証拠はありませんが、お勧めできません。これらのトリートメントを使用した場合、FRトリートメントの妨げにはなりません。

Q: ストレスは脱毛の要因になりますか？

A: 身体が著しい身体的または精神的ストレスにさらされると、免疫系が毛包を攻撃する抗体を生成する可能性があります。このプロセスにより、脱毛部分や広範囲の脱毛が発生します。ストレスによる脱毛はFR治療によく反応するため、治療を中止して回復した新しい髪を保つことができます。

Q: 泳いだり、髪を濡らしたりしても大丈夫ですか？

A: 製品を塗布した後、少なくとも3時間は髪をすすがないようにしてください。泳ぐ予定がある場合は、直後に乾いた頭皮に再度製品を塗布するか、塗布後少なくとも3時間待ってから泳ぐことをお勧めします。

Q: この治療によって性欲は減りますか？

A: いいえ、性的な副作用を伴う可能性のある一部の経口薬治療とは異なり、FR治療は性欲に影響を及ぼさないことが示されています。研究者は、勃起を改善するためにミノキシジルを局所的に使用することについて調査する研究も行っています。FR治療に含まれるその他の成分(ハーブエキスとビタミン複合体)は、性機能に干渉することはないと思われま

Q: フレークが見つかった場合はどうすればいいですか？

A: 約5%のユーザーがFR治療による剥離や炎症に気づきます。このような剥離は、実際には細胞のターンオーバーの増加を示している可能性があります。数週間経っても炎症が続く場合は、治療を中止することをお勧めします。

Q: ジヒドロテストステロンとは何ですか？

A: ジヒドロテストステロン(DHT)は男性更年期障害の主な原因であると考えられています。脱毛症の原因となる。DHTはテストステロンが皮脂腺と接触すると生成されます。毛包を収縮させ、頭皮を厚くする傾向があり、毛細血管への血流を制限します。これらのプロセスは脱毛につながります。

Q: FRトリートメントを使用した後、髪をドライヤーで乾かしても大丈夫ですか？

A: 乾燥により溶液の一部が蒸発する可能性があるため、FRトリートメントはブロー乾燥後に塗布するのが最適です。そのため、塗布後にブロー乾燥することはお勧めできません。

Q: どのような結果が期待できますか？

A: 約2週間で抜け毛が止まり始め、1~2か月で新しい髪が生え始めます。抜け毛が少量の場合は、すぐに顕著な効果を実感できるはずですが、脱毛が進行した段階では、効果が現れるまでに最大6か月かかることがあります。

Q: 副作用が出たらどうすればいいですか？

A: かゆみや皮剥けが起こったら、塗る量を減らしてみてください。症状が治まったら、通常の用量に達するまで徐々に増やしてください。めまいや息切れを感じた場合は、医師に相談してください。ミノキシジルは血圧を下げる可能性があるため、血圧をチェックすることをお勧めします。以下の症状がある場合はFR治療を使用しないでください。

低血圧。

Q: FR治療はどれくらい効果的ですか？

A: 追加の成分を加えると、FRトリートメントは大幅にミノキシジル単独よりも効果的です。ロゲインに反応しなかったユーザーの多くは、FR治療に反応します。FR治療による劇的な効果が期待できます。

Q: FR治療に最適な候補者は誰ですか？

A: FR治療の理想的な候補者は、男性型脱毛症(脱毛症)の症状を予防する方が回復させるよりも簡単です。15年以上にわたって頭皮の大きな部分が目に見える状態になっている場合、FR治療は効果が無い可能性があります。

Q: FR治療から何を期待できますか？

A: 現実的な期待を持つことが重要です。髪の毛は1か月あたり約1~1.5cm伸びるので、すぐに効果を実感することはできません。最初の2週間は、古い毛が押し出され、毛包が新しい毛を生やす準備をするため、抜け毛が加速するのを感じることがかもしれません。治療を続けてください。継続して2~6か月使用すると、顕著な効果が期待できます。

Q: FR治療を1日2回ではなく1回使用してもよいですか？

A: FR治療の効果を得るには、1日2回、できれば朝と夕方に使用する必要があります。1年か2年後には、維持のために1日1回に戻すことを検討してください。

Q: FR治療を1回または2回スキップできますか？

A: 治療は継続して行うことを強くお勧めしますが、塗布を忘れた場合は、補うために次の投与量を増やさずにください。通常の毎日の治療スケジュールをそのまま続けてください。

Q: どれくらいの期間、髪が抜けずに使用を中止できますか？

A: 望ましい結果が得られたら、新たな脱毛が起こらないように1~2週間治療を中断することも可能です。ただし、FRを使用するのが最善です。強く健康的な髪を維持するために、継続的にトリートメントを施します。


Q: どんなシャンプーを使えばいいですか？

A: 効果を最大限に高めるには、ナトリウムを含まないFollics S1やS2ヘアグロスシャンプーなどの高品質のシャンプーで髪を洗ってください。ラウリル硫酸塩またはラウレス硫酸ナトリウムは、皮膚の炎症、乾燥、損傷を引き起こすことが多い製品に使用される安価な洗剤です。髪が気になる場合は、頭皮の健康を維持することが重要です。頭皮のフケ、脂、細菌の蓄積は、脱毛に関連しています。

Q: Follics FR治療はどの脱毛段階を対象としていますか？

A: ノーウッドスケールの脱毛段階IからVIIです。

(下記参照)



Sapphire Healthcare LLC® 向けに製造されています。詳細については、Follics.comをご覧ください。